

Sr. (a) Agricultor(a),

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se ocorrência de temperaturas elevadas, pelo que recomendamos:

POMÓIDEAS (macieira/pereira)

Bichado-da-fruta

Tendo em conta que se mantêm as capturas nos nossos Postos de Observação Biológica (POB), bem como as condições meteorológicas atualmente favoráveis ao desenvolvimento da praga, recomenda-se a renovação do tratamento fitossanitário.

Mosca do Mediterrâneo

Esta praga afeta os frutos de várias espécies vegetais, sendo particularmente prejudicial na fase de maturação. Recomenda-se a adoção prioritária de métodos de luta biotécnica, como a captura em massa, que consiste na colocação estratégica de armadilhas contendo atrativos específicos. Estas armadilhas atraem adultos, contribuindo para a redução significativa da população. No mercado estão disponíveis diversas soluções para este fim.



Fig. 1 – mosca do mediterrâneo.

Fonte: <https://antropocene.it/en/2023/02/13/ceratitis-capitata-2/>

Sempre que possível, utilize uma armadilha de monitorização para acompanhar o voo dos insetos adultos. Paralelamente, deverá ser feita a observação visual regular de 100 frutos (4 frutos em 25 árvores escolhidas ao acaso), com o objetivo de detetar sinais de picada. O tratamento,

com um inseticida homologado, justifica-se quando se verificar a presença de adultos na armadilha e/ou entre 1 a 3 frutos picados na amostragem.

Vinha

Práticas culturais

Uma vez preverem-se elevadas temperaturas chamamos à atenção para que, caso tenha a intenção de preconizar alguma intervenção em verde, nomeadamente desfolha considere a possibilidade da ocorrência de fenómenos de escaldão.

Cigarrinha-verde

Nas vinhas/parcelas/castas que tenham sofrido ataques significativos em anos anteriores, recomenda-se a vigilância através da observação de ninfas verde-translúcidas que se movem de forma rápida e oblíqua na parte inferior das folhas, em pelo menos 100 folhas (2 folhas em 50 cepas) e tratamento no caso de contabilizar mais de 50 ninfas.

Em vinhas com idade inferior a 4 anos, o tratamento deve ser sempre efetuado à presença da praga.



Fig. 2 – cigarrinha-verde.

Fonte: <https://quintinha2018.blogspot.com/2020/06/ciclo-desenvolvimento-da-cigarrinha.html>

1. Encontrando-nos em fase de maturação das variedades precoces, tenha em atenção, ao intervalo de segurança dos produtos aplicados (número de dias entre a aplicação do produto fitofarmacêutico e a colheita).
2. Na seleção do inseticida, verifique o número máximo de aplicações anuais para a cultura.
3. Leia atentamente os rótulos dos produtos fitofarmacêuticos.